

## Metyylifenidaattihoidon aikana käytettävä seuranta-kaavio

Kuten Methylphenidate STADAn valmisteyhteenvedossa on ohjeistettu, potilaan kasvua sekä psykiatrista ja kardiovaskulaarista tilaa on seurattava säännöllisesti:

- Verenpaine ja syke on kirjattava jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään 6 kuukauden välein.
- Pituus, paino ja ruokahalu on kirjattava vähintään 6 kuukauden välein ja kasvukäyriä on seurattava.
- Uusien oireiden kehittymistä tai jo olemassa olevien psykiatristen häiriöiden pahenemista on seurattava jokaisella käynnillä, jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään 6 kuukauden välein.

Ensimmäisen arvioinnin päivämäärä: \_\_\_\_\_ Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Syntymäaika: \_\_\_\_\_ Ikä: \_\_\_\_\_ Sukupuoli: \_\_\_\_\_

	Lähtötaso	Seuraavat käynnit											
Arviointi-päivämäärä													
Arvioinnin syy													
Verenpaine*													
Syke*													
Paino (kg)**													
Pituus (cm)**													
Ruokahalu**													

\*Verenpaine ja syke on kirjattava jokaisen annosmuutoksen yhteydessä ja sen jälkeen vähintään 6 kuukauden välein.

\*\*Pituus, paino ja ruokahalu on kirjattava vähintään 6 kuukauden välein ja kasvukäyriä on seurattava.