

## Tjekliste 2: Tjekliste for methylphenidat (MPH) til monitorering af igangværende behandling

Det efterfølgende har til hensigt at støtte dig i monitoreringen af igangværende behandling af de relevante ADHD-patienter, som behandles med et produkt, som indeholder MPH.

Som beskrevet mere detaljeret i produktresumeeet skal vækst, psykiatrisk og kardiovaskulær status monitoreres regelmæssigt:

- Blodtryk og puls skal registreres ved hver justering af dosis og derefter mindst halvårligt
- Højde, vægt og appetit skal mindst registreres halvårligt således at vækstkurven løbende opdateres
- Udvikling af nyopståede eller forværring af forud eksisterende psykiatriske lidelser skal monitoreres ved hver justering af dosis og derefter mindst halvårligt og ved hvert besøg

Det anbefales, at denne tjekliste bruges sammen med produktresumeeet for Methylphenidate Stada.

Download og print denne tjekliste inden konsultationen. Det vil ikke være muligt for dig at gemme patientspecifikke oplysninger på hjemmesiden. Den udfyldte tjekliste kan anvendes som dokumentation i patientjournalerne.

Efterhånden som du arbejder dig igennem tjeklisten, kan det endvidere være praktisk sammen med patienten og forældre eller værge at gennemgå indlægssedlen for Methylphenidate Stada.

### Monitorering under igangværende behandling med MPH

Dato for vurdering: \_\_\_\_\_

Årsag til vurdering: \_\_\_\_\_

Patientens navn: \_\_\_\_\_

Fødselsdato: \_\_\_\_\_

Alder: \_\_\_\_\_ Køn: \_\_\_\_\_

**Gennemgå omhyggeligt følgende systemer som indikeret herunder ved hver justering af dosis og ved opfølgingsbesøg mindst halvårligt:**

	Evalueret
<b>Generel lægelige vurdering</b>	
• Dokumentér højde, vægt og appetit (Skema til løbende monitorering under behandling med methylphenidat (MPH))	<input type="checkbox"/>
<i>Overvej seponering af MPH, hvis vækst er under det forventede</i>	
• Dokumentér enhver tegn på misbrug, forkert brug eller ikke-terapeutisk anvendelse af MPH	<input type="checkbox"/>

• Graviditet	<input type="checkbox"/>
<i>Evaluer fordel/risiko</i>	
<b>Nye kardiovaskulære fund</b>	Blodtryk og puls skal registreres
• Palpitationer	<input type="checkbox"/>
• Brystsmerte ved belastning	<input type="checkbox"/>
• Uforklaret synkope	<input type="checkbox"/>
• Dyspnø	<input type="checkbox"/>
• Andre symptomer, der tyder på hjertesygdom	<input type="checkbox"/>
<i>Henvis til øjeblikkelig evaluering hos hjertespecialist</i>	
<b>Nye neurologiske fund</b>	
• Alvorlig hovedpine, følelseløshed, svaghed eller lammelse, nedsættelse af koordinationsevne, syn, tale, sprog eller hukommelse	<input type="checkbox"/>
<i>Ovenstående tilstande kan tyde på cerebral vaskulitis: afbryd MPH behandlingen</i>	
• Stigning i hyppigheden af anfald eller helt nye anfald	<input type="checkbox"/>
<i>MPH bør seponeres</i>	
	<b>Evalueret</b>
<b>Nye psykiatriske fund eller forværring af eksisterende psykiatriske symptomer</b>	Udvikling af nyopståede eller forværring af forud eksisterende psykiatriske lidelser skal monitoreres
• Psykotiske eller maniske symptomer	<input type="checkbox"/>
<i>Overvej seponering af MPH</i>	
• Selvmordsforestillinger eller -adfærd	<input type="checkbox"/>
<i>Overvej behandling af underliggende psykiatrisk tilstand</i>	
<i>Evaluer fordel/risiko igen</i>	
<i>Overvej seponering af MPH</i>	
• Aggressiv og fjendtlig adfærd	<input type="checkbox"/>
<i>Overvej behovet for justering af behandling</i>	
• Angst, agitation eller anspændthed	<input type="checkbox"/>
• Depressive symptomer	<input type="checkbox"/>
• Motoriske eller verbale tics eller forværring deraf	<input type="checkbox"/>
<b>Behandlingens varighed</b>	
• Patienten behandles kontinuerligt i >12 måneder	<input type="checkbox"/>
• Bedring i symptomer efter fornøden justering af dosis over en periode på 1 måned observeres, ellers anbefales seponering af lægemiddel	<input type="checkbox"/>
<i>Overvej prøveperiode uden medicin mindst én gang om året for at fastlægge, om fortsat behandling stadig er nødvendig</i>	

Registrer eventuelle yderligere oplysninger her

--

--

Efter evalueringen herover bruges det medfølgende skema til at registrere de oplysninger, der kræves til løbende monitorering

(Se skema til løbende monitorering under behandling med methylphenidat (MPH)).

### **Slut på behandling**

Der kræves omhyggelig overvågning ved seponering, eftersom det kan afsløre

- **Depression** såvel som
- **Kronisk hyperaktivitet**

Nogle patienter kan have brug for langvarig opfølgning.