

# Agomelatine STADA

## Muistutuskorttisi verikokeille

### HUOMIOI

Agomelatine Stada -hoidon aikana on tärkeää käydä säännöllisesti verikokeissa.

**Seuraava taulukko auttaa sinua muistamaan verikokeiden ajanvaraukset.**

Agomelatin STADA -hoidon aloituksen päivämäärä:	
Verikokeet maksaentsyymien määrittämiseksi	Päivämäärä
1. verikoe (hoidon aloitus)	
2. verikoe noin 3 viikon kuluttua	
3. verikoe noin 6 viikon kuluttua	
4. verikoe noin 3 kuukauden kuluttua	
5. verikoe noin 6 kuukauden kuluttua	

Annoksen suurentaminen 50 mg:aan – päivämäärä:	
Verikokeet maksaentsyymien määrittämiseksi	Päivämäärä
1. verikoe 50 mg:n annoksen käytön alkaessa	
2. verikoe noin 3 viikon kuluttua	
3. verikoe noin 6 viikon kuluttua	
4. verikoe noin 3 kuukauden kuluttua	
5. verikoe noin 6 kuukauden kuluttua	

Lääkärisi voi päättää lisäverikokeiden ottamisesta. Muista ottaa tämä kortti mukaan lääkärikäynnillesi. Lue Agomelatine Stada -valmisteen pakkausseloste tarkempien tietojen saamiseksi.

## ESITE POTILAALLE

\_\_\_\_\_  
Potilaan nimi

\_\_\_\_\_  
Lääkärin yhteystiedot

Agomelatine STADA kuuluu masennuslääkeryhmään ja sitä käytetään masennuksen hoitoon. Noudata lääkärin antamia ohjeita agomelatiinin käytöstä (annos, hoidon kesto, seurantakäynnit, verikokeet) saadaksesi parhaimman hyödyn lääkkeestäsi.

### Suosituksia maksan kohdistuvien haittavaikutusten välttämiseen

Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia maksasi toimintaan. Tämä esite ohjeistaa sinua, kuinka voit välttää maksan kohdistuvia haittavaikutuksia ja mitä sinun tulisi tehdä, jos saat näitä haittavaikutuksia agomelatiinihoidon aikana.

### Kysy lääkäriltäsi lisätietoja.

*Lue pakkausessa oleva pakkausseloste.*

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

tai

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310, 00101 Helsinki

[stada@stada.fi](mailto:stada@stada.fi)

## Ennen kuin aloitat Agomelatine STADA -valmisteen käytön

**Puhu lääkärisi kanssa, jos tiedät, että maksasi ei toimi normaalisti.**

Älä ota Agomelatine STADA -valmistetta siinä tapauksessa.

**Agomelatine Stada ei välttämättä ole sopiva sinulle.**

Kysy lääkäriltäsi neuvoa,

- jos sinulla on ollut maksan toimintahäiriö
- jos olet liikalihava tai ylipainoinen
- jos sinulla on diabetes
- jos käytät alkoholia
- jos käytät muita lääkkeitä (joiden tiedetään vaikuttavan maksaan).

## Miten voit välttää maksan toimintahäiriöt hoidon aikana

**Käy säännöllisesti kontrolliverikokeissa.**

### Miksi?

Lääkärin on pitänyt tarkistaa maksasi toiminta **ennen hoidon aloittamista**. Verikokeiden avulla lääkäri pystyy arvioimaan, **kuinka sinun maksasi toimii** ja seuraamaan, sopiiko Agomelatine STADA sinulle.

Joillakin potilailla saattavat veren maksa-arvot nousta Agomelatine STADA -hoidon aikana. Nämä maksaentsyymiarvot kertovat, toimiiko maksasi kunnolla ja ovat erittäin tärkeitä hoitosi seurannassa.

## Milloin?

	Ennen hoidon aloittamista tai annoksen suurentamisen yhteydessä	Noin 3 viikon kuluttua	Noin 6 viikon kuluttua	Noin 3 kuukauden kuluttua	Noin 6 kuukauden kuluttua
Verikoe	✓	✓	✓	✓	✓

Jos lääkäri **nostaa annoksen 50 mg:aan**, tulee verikokeet ottaa uudelleen.

**Muista ottaa tämä kortti mukaan lääkärikäynneillesi.**

Kerro välittömästi lääkärille, jos saat tietää, että veresi maksaentsyymiarvot ovat kohonneet hoidon aikana.

## Tarkkaile maksan toimintahäiriöön viittaavia merkkejä

Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, on mahdollista, että maksasi ei toimi kunnolla:

- ihon tai silmien keltaisuus
- tummentunut virtsa
- vaaleat ulosteet
- ylävatsan oikeanpuoleinen kipu
- epätavallinen väsymys (etenkin muiden yllä olevien oireiden yhteydessä).

**Kysy välittömästi neuvoa lääkäriltä. Hän saattaa kehottaa sinua lopettamaan Agomelatine STADA -valmisteen käytön.**