

VIGTIG INFORMATION – Kasser ikke!

Agomelatin STADA

Til behandling af episoder med svær depression hos voksne

Patientkort

Agomelatin STADA er et antidepressiva, der kan hjælpe dig til at behandle depression.

For at opnå den bedst mulige effekt af medicinen, følg din læges anvisning på hvordan du skal tage Agomelatin STADA (dosis, behandlingsvarighed, tilhørende opfølgende aftaler, blodprøver).

Anbefalinger for at undgå leverbivirkninger

Agomelatin STADA kan forårsage bivirkninger, som inkluderer ændringer af hvordan din lever virker.

Denne guide vil give dig råd til:

- **hvordan du undgår leverbivirkninger**
- **hvad du skal gøre, hvis der opstår leverbivirkninger under Agomelatin STADA behandlingen**

Spørg din læge for yderligere information.

For mere detaljeret information, læs indlægssedlen der er vedlagt i Agomelatin STADA pakningen, eller på www.indlaegssedel.dk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Det skal du gøre, før du tager Agomelatin STADA

Fortæl din læge, hvis du har leverproblemer: tag ikke Agomelatin STADA, hvis dette er tilfældet.

Der kan være andre grunde til at Agomelatin STADA ikke er det rette lægemiddel til dig.

Spørg din læge til råds i følgende tilfælde:

- Hvis du har, eller har haft leverproblemer
- Hvis du lider af fedme, eller er overvægtig.
- Hvis du har diabetes
- Hvis du drikker alkohol
- Hvis du tager anden medicin (som vides at påvirke leveren)

For at undgå leverproblemer under din behandling, kan du gøre som følgende:

Få taget regelmæssige blodprøver.

Hvorfor?

Din læge vil kontrollere, at din lever fungerer korrekt **inden du starter behandlingen** ved at tage nogle blodprøver. Resultatet vil fortælle lægen, hvordan din lever fungerer og om Agomelatin STADA er det rette lægemiddel til dig.

Nogle patienter får forhøjede niveauer af leverenzymet i blodet under behandlingen med Agomelatin STADA. Niveaulet af disse leverenzymet vil indikere om din lever fungerer korrekt, hvilket er afgørende for lægen ved monitorering af din behandling.

Hvornår?

	Før behandlingsstart eller ved dosisøgning	Efter ca. 3 uger	Efter ca. 6 uger	Efter ca. 3 måneder	Efter ca. 6 måneder
Blodprøver	✓	✓	✓	✓	✓

Hvis din læge øger dosis til 50 mg, skal der foretages tests igen.

Husk at medbringe dette kort, når du tager til lægen.

Fortæl omgående din læge, hvis dine leverenzzymer i blodet øges under behandlingen.

Vær særlig opmærksom på tegn på leverproblemer

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, kan det være tegn på at din lever ikke virker korrekt:

- Gulfarvning af hud/øjne
- Mørkfarvning af urinen
- Lys afføring
- Smerter øverst til højre i maven
- Usædvanlig træthed (især i forbindelse med andre af ovennævnte symptomer)

→ **Kontakt hurtigst muligt lægen, der måske vil råde dig til at stoppe med at tage Agomelatin STADA.**

DINE BLODPRØVEAFTALER

HUSK

Når du tager Agomelatin STADA, er det vigtigt at du får taget blodprøver regelmæssigt. Skemaet herunder vil hjælpe dig med at holde styr på blodprøveaftalerne.

	Dato
Agomelatin STADA 25 mg – behandlingsstart	
Blodprøver for leverenzzymer	
1. blodprøve (ved behandlingsstart)	
2. blodprøve (efter ca. 3 uger)	
3. blodprøve (efter ca. 6 uger)	
4. blodprøve (efter ca. 3 måneder)	
5. blodprøve (efter ca. 6 måneder)	

	Dato
Dosis øget til 50 mg	
Blodprøver for leverenzzymer	
1. blodprøve (ved behandlingsstart)	
2. blodprøve (efter ca. 3 uger)	
3. blodprøve (efter ca. 6 uger)	
4. blodprøve (efter ca. 3 måneder)	
5. blodprøve (efter ca. 6 måneder)	

Din læge vil beslutte om der skal tages yderligere blodprøver.

Husk at medbring dette kort, når du tager til lægen