

## Emtricitabin/tenofoviridisoproxil STADA Checklista för föreskrivare

**Insättande av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för profylax innan exponering (PrEP).**

**Instruktioner: Fyll i checklista vid varje besök och spara den i patientens journal.**

Jag har genomfört följande innan förskrivning av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för indikationen profylax innan exponering (PrEP) till patienter som skall börja ta eller redan tar kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP-indikationen:

### Labororietester/Utvärdering

- Har genomfört riskutvärdering hos patient som inte är smittad med hiv.
- Har bekräftat negativt hiv-test omedelbart innan insättande av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir på PrEP-indikation.
  - Om kliniska symtom som överensstämmer med akut viral infektion föreligger och senare exponering för hiv-1 misstänks ha skett nyligen (<1 månad) ska användningen av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP skjutas upp i minst en månad och negativt hiv-1-status bekräftas på nytt med hjälp av ett test med kombinerade antigener/antikroppar.
- Har screenat för sexuellt överförbara sjukdomar, så som syfilis och gonorré.
- Har, om tillämpligt, utvärderat risk/nytta för kvinnor som kan vara gravida eller kanske vill bli gravida.
- Har testat för HBV
- Har erbjudit HBV-vaccination
- Har säkerställt att uppskattat kreatininclearance är  $\geq 60$  ml/min innan insättande av läkemedlet.
- Har återkommande under behandlingen säkerställt att kreatininclearance är  $\geq 60$  ml/min och att serumfosfat är  $\geq 1,5$  mg/dl (0,48 mmol/l).
  - Om kreatininclearance är sänkt till  $< 60$  ml/min eller om serumfosfat är sänkt till  $< 1,5$  mg/dl (0,48 mmol/l) hos någon individ som får kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för profylax innan exponering (PrEP), ska njurfunktionen utvärderas på nytt inom en vecka, inklusive mätning av blodglukos-, blodkaliumoch uringlukoskoncentrationer. Överväg också att avbryta behandlingen med tenofovir hos patienter där kreatininclearance har minskat till  $< 60$  ml/min eller serumfosfat sänkts till  $< 1,0$  mg/dl (0,32 mmol/l). Överväg också att avbryta behandlingen vid fortskridande försämring av njurfunktion när ingen annan orsak har identifierats.
- Har säkerställt att individen som löper risk för hiv-1-smitta, inte tar några andra läkemedel mot hiv-1 eller HBV.

### Rådgivning/Uppföljning

- Har gett råd om vikten av inbokade uppföljningar, inklusive regelbundna hiv-tester (t.ex. minst var 3:e månad) för att på nytt bekräfta hiv-1-negativ status medan kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir tas för PrEP-indikationen.

- Har diskuterat vikten av att avbryta behandlingen med kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir om serokonvertering sker, för att minska risken för uppkomst av resistent hiv-1-varianter.
- Har gett råd om vikten av följsamhet med den dagliga doseringsregimen.
- Har gett råd om att kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP-indikationen bara ska användas som en övergripande förebyggande strategi och har informerat om vikten av att alltid tillämpa säkert sex och att använda kondomer på ett korrekt sätt.
- Har diskuterat vikten för individen av att känna till sin hiv-1-status och om möjligt hiv-1-statusen hos sin/a partner/partners.
- Har diskuterat vikten av att screena för sexuellt överförbara sjukdomar, så som syfilis och gonorré som kan öka risken för hiv-1-överföring.
- Har diskuterat kända säkerhetsrisker vid användning av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir på PrEP-indikation.
- Har gått igenom patientinformationen ” Viktig information om kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion)” med patienten.
- Har skrivit in nästa uppföljningsmöte och datum för hiv-1-screeningsprov i *Påminnelsekortet* och lämnat ut detta till patienten.

#### Påminnelsekort Framsida

#### **Kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP-Påminnelsekort**

Du har ordinerats kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir som profylax före exponering (PrEP, preexponeringsprofylax). För att detta läkemedel ska fungera på bästa sätt är det viktigt att du inte missar eller hoppar över någon dos.

Du ska ta en tablett med kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir varje dag, vid samma tidpunkt, om det är möjligt tillsammans med mat.

Det är bra att göra det till en del av din rutin att ta kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir, till exempel att ta det till lunchen, eller när du borstar tänderna efter frukosten.

Det är viktigt att hitta en tid som fungerar för dig.

Det kan vara till hjälp att använda kalendern nedan för att pricka av varje dag du tagit kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir. Kryssa i första veckan den dag du börjar ta kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir, kryssa sedan i rätt ruta varje dag efter att du tagit kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir.

	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön
Vecka 1							
Vecka 2							
Vecka 3							
Vecka 4							
Vecka 5							
Vecka 6							

Efter 30 dagar (en burk med tabletter) kommer du behöva börja med en ny kalender.

Om du redan använder en kalender på din telefon eller dator, kan du lägga till en påminnelse för kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir.

#### Baksida

#### **Påminnelse klinikbesök**

Ditt nästa inplanerade besök är:

Inbokat besök	Datum	Tid	Mottagning

*Det är det möjligt att ladda ned och skriva ut denna checklista från [www.stadanordic.se](http://www.stadanordic.se) eller från [www.fass.se](http://www.fass.se)*